



MEDISCH CENTRUM
KINDERWENS

VRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK, IVF EN SPERMABANK

Pregnyl® 10.000 IE

De prikinstructie



Pregnyl[®] gebruik 10.000 IE

Benodigheden:

- 2 ampullen Pregnyl[®] poeder (5.000 IE per ampul)
- 1 ampul oplosvloeistof (de andere ampul heeft u niet nodig)
- 2 ml spuitje
- Grote naald
- Klein naaldje



Het openbreken van de ampullen

- Gaasje of tissue gebruiken bij het openen van de ampul
- Stip naar u toe en dan “van u af” breken



- **Neem het spuitje uit de verpakking**



- **Zet vervolgens de grootste naald op het spuitje (goed aandrukken)**



Het oplossen

- **Zuig de solvens (= oplosvloeistof) op**



- Spuit de vloeistof in de ampul met de Pregnyl[®] poeder
- Het poeder lost meteen op



- **Zuig de oplossing weer op in het spuitje**
- **Spuit deze oplossing in de tweede ampul Pregnyl®poeder**
- **En zuig de oplossing weer op in het spuitje**



Het ontluchten

- **Zet het kleine naaldje op het spuitje (goed aandrukken)**



- **Ontlucht het spuitje door de lucht omhoog te tikken (in de richting van het naaldje)**
- **Duw dan langzaam de stamper omhoog tot er een klein druppeltje vloeistof aan het uiteinde van de naald tevoorschijn komt**



Het toedienen van de Pregnyl[®] injectie

- **Huidplooi pakken (vlak onder de navel of van het bovenbeen)**



- **Breng het naaldje recht in de huid**



- **Duw de stamper langzaam in totdat het spuitje leeg is**
- **Wacht ongeveer 5 seconden voordat u het naaldje uit de huid haalt**



- **Gooi de naalden in de naaldenbeker en lever deze in bij de apotheek.**

