



MEDISCH CENTRUM  
KINDERWENS

VRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK, IVF EN SPERMABANK

# Pregnyl<sup>®</sup> 5.000 IE

## De prikinstructie



# Pregnyl<sup>®</sup> gebruik 5.000 IE

## Benodigdheden:

- 1 ampul Pregnyl<sup>®</sup> poeder (5.000 eenheden)
- 1 ampul oplosvloeistof
- 2 ml spuitje
- Grote naald
- Klein naaldje



# Het openbreken van de ampullen

- Gaasje of tissue gebruiken bij het openen van de ampul
- Stip naar u toe en dan “van u af” breken



- **Neem het spuitje uit de verpakking**



- **Zet vervolgens de grootste naald op het spuitje (goed aandrukken)**



Medisch Centrum Kinderwens

# Het oplossen

- **Zuig de solvens (= oplosvloeistof) op**



- Spuit de vloeistof in de ampul met de Pregnyl<sup>®</sup> poeder
- Het poeder lost meteen op
- Zuig de oplossing weer op in het spuitje



# Het ontluchten

- **Zet het kleine naaldje op het spuitje (goed aandrukken)**



- **Ontlucht het spuitje door de lucht omhoog te tikken (in de richting van het naaldje)**
- **Duw dan langzaam de stamper omhoog tot er een klein druppeltje vloeistof aan het uiteinde van de naald tevoorschijn komt**



# Het toedienen van de Pregnyl<sup>®</sup> injectie

- **Huidplooi pakken (vlak onder de navel of van het bovenbeen)**



- **Breng het naaldje recht in de huid**



- **Duw de stamper langzaam in totdat het spuitje leeg is**
- **Wacht ongeveer 5 seconden voordat u het naaldje uit de huid haalt**



- **Gooi de naalden in de naaldenbeker en lever deze in bij de apotheek.**

